Université Pierre et Marie Curie-Paris 6

Examen U.E. LP101 2^{ème} Session 2007-2008

L'usage des calculatrices et de tout autre document est interdit.
Les parties I, II et III sont indépendantes, un barème indicatif est mentionné.
Durée : 2 heures.

I) Question de cours (environ 12 points) :

- 1) Énoncer le théorème de l'énergie cinétique en précisant la signification de chaque terme.
- 2) Pour quel type de force peut-on définir une énergie potentielle ? Pour une force de ce type, donner la formule vectorielle la reliant à l'énergie potentielle.

II) Mécanique (environ 26 points) :

On considère le dispositif de la figure 1. Un anneau de masse m peut glisser sans frottement sur une tige horizontale. Il est attaché à un ressort de constante de raideur k , de masse négligeable et de longueur à vide l_0 , dont l'autre extrémité est solidement attachée à un point fixe P. La position M de l'anneau est repérée sur la tige par son abscisse x , l'origine du repère étant un point O, projection orthogonale de P sur la tige. La distance entre O et P est notée a . Cette distance est inférieure à la longueur à vide l_0 du ressort.

Figure 1

On note A et B les deux points de la tige qui correspondent aux positions de l'anneau pour lesquelles la longueur l du ressort est égale à sa longueur à vide l_0 (on considérera que B a une abscisse positive).

Analyse qualitative

- 1) En faisant un schéma des forces appliquées à l'anneau lorsqu'il se trouve en O puis en B, montrer, sans calcul, que ces deux points sont des positions d'équilibre de l'anneau.
- 2) Déterminer sans calcul la troisième position d'équilibre du système.
- 3) En faisant des schémas des forces appliquées à l'anneau de part et d'autre de chaque position d'équilibre, discuter la stabilité de celles-ci.

Analyse quantitative

- 1) Donner l'expression de la longueur $l(x)$ du ressort en fonction de l'abscisse x de l'anneau. En déduire que l'énergie potentielle $E_p(x)$ de l'anneau s'écrit (à une constante additive près) :

$$E_p(x) = \frac{1}{2}k(\sqrt{x^2 + a^2} - l_0)^2$$

- 2) Le graphe de $E_p(x)$ est tracé sur la figure ci-dessus. Reproduire ce graphe sur votre copie, et placer les abscisses des points O, A et B.
- 3) A quelle condition sur $E_p(x)$ l'anneau est-il à l'équilibre ? Déterminer par le calcul les abscisses des positions d'équilibre de l'anneau.
- 4) A partir du graphe, discuter la stabilité de l'équilibre en ces points.

Energie

On place l'anneau au point M d'abscisse x_M telle que $E_p(x_M) = 2 E_p(0)$, et on le lâche sans vitesse initiale.

- 1) Calculer $E_p(0)$ et placer cette valeur sur votre graphe.
- 2) Déterminer l'énergie mécanique $E_m(x)$ de l'anneau au cours de son mouvement. Dessiner la courbe correspondant sur le graphe de l'énergie potentielle $E_p(x)$.
- 3) En déduire les positions extrêmes de l'anneau au cours de son mouvement. Décrire ce mouvement.
- 4) On suppose maintenant que l'anneau frotte sur la tige lors de son déplacement. Quelle va être la position finale de l'anneau ? Représenter schématiquement l'évolution de l'énergie mécanique de l'anneau au cours de son mouvement.

III) Electrostatique (environ 17 points) :

- 1) Donner l'expression générale du potentiel électrique V créé en un point P par une charge ponctuelle q ($q > 0$) fixée en un point O.
- 2) Donner l'expression générale du champ $\vec{E}$ électrique créé en un point P par une charge ponctuelle q ($q > 0$) fixée en un point O (on fera un schéma représentatif).
- 3) Donner la relation vectorielle générale qui relie les deux grandeurs précédentes (potentiel et champ électriques).

- 4) On considère un anneau extrêmement fin, de centre O , posé à plat sur le sol (l'anneau est si fin qu'on peut considérer qu'il a un rayon moyen R). Il est uniformément chargé, de charge totale Q ($Q > 0$).

- 4-a) En utilisant la symétrie du problème, donner la direction du champ électrique créé par l'anneau en un point P situé sur l'axe central de l'anneau, à l'altitude $z > 0$. Faire un schéma.
- 4-b) Donner la distance $d(z)$ séparant le point P d'altitude $z > 0$ d'un point quelconque de l'anneau.
- 4-c) Quelle est l'expression du potentiel $V(z)$ créé par l'anneau au point P d'altitude $z > 0$?